



ĐỀ THI THỬ TRỰC TUYẾN

(Đề thi có 2 trang)

CUỐI KỲ 1 - NĂM HỌC 2026–2027

MÔN: HÓA HỌC - LỚP 11

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Phát hành ngày 17/09/2026

Họ và tên:

Số báo danh:

Mã đề: H11.CK1.014

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong bài thực hành chuẩn độ dung dịch HCl bằng dung dịch NaOH, dụng cụ dùng để lấy chính xác thể tích dung dịch HCl cho vào bình tam giác là

- A. pipette B. buret C. ống đong D. cốc có mỏ

Câu 2. Từ phần trăm khối lượng các nguyên tố, muốn ra tỉ lệ số nguyên tử thì

- A. Chia mỗi phần trăm cho nguyên tử khối của nguyên tố tương ứng
B. Nhân mỗi phần trăm với nguyên tử khối của nguyên tố tương ứng
C. Chia mỗi phần trăm cho phân tử khối của hợp chất
D. Lấy luôn các phần trăm làm tỉ lệ số nguyên tử

Câu 3. Cho Zn tác dụng hết với dung dịch H_2SO_4 loãng. Khí thoát ra là

- A. O_2 B. H_2 C. SO_2 D. H_2S

Câu 4. Phèn chua $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ được dùng để làm trong nước đục,

- A. vì phèn chua phản ứng với nước sinh ra khí đẩy cặn nổi lên
B. vì Al^{3+} thủy phân tạo $\text{Al}(\text{OH})_3$ dạng keo kéo cặn lắng xuống
C. vì SO_4^{2-} thủy phân tạo kết tủa trắng
D. vì phèn chua làm nước có môi trường base mạnh nên cặn tan hết

Câu 5. Cho cân bằng $2\text{SO}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(g)$. Biểu thức hằng số cân bằng K_C của cân bằng ấy là

- A. $K_C = \frac{[\text{SO}_2]^2[\text{O}_2]}{[\text{SO}_3]^2}$ B. $K_C = \frac{[\text{SO}_3]}{[\text{SO}_2] + [\text{O}_2]}$ C. $K_C = \frac{[\text{SO}_3]}{[\text{SO}_2][\text{O}_2]}$ D. $K_C = \frac{[\text{SO}_3]^2}{[\text{SO}_2]^2[\text{O}_2]}$

Câu 6. Một mẫu phân bón phòng thí nghiệm **chỉ gồm** NH_4Cl và $(NH_4)_2SO_4$ mẫu đã sấy khô, cân, rồi hoà tan và định mức. Hai aliquot được phân tích theo **hai kênh khác nhau**. **Aliquot A:** thêm base mạnh dư, $NH_4^+ + OH^- \rightarrow NH_3 + H_2O$ toàn bộ NH_3 bay sang bẫy và cho một tín hiệu. Sau khi trừ nền, tín hiệu đổi ra mol NH_3 **bắt được** theo hệ số k_A lượng NH_3 **sinh ra thật** bằng lượng bắt được chia hiệu suất của bẫy. **Aliquot B:** acid hoá rồi thêm Ba^{2+} dư, $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4 \downarrow$ kết tủa lọc, sấy, cân. Trừ mẫu trắng rồi chia hiệu suất của **kênh này** mới ra mol $BaSO_4$ thật.

Đại lượng	Giá trị
Khối lượng mẫu khô đã cân	$7,368 \pm 0,003$ g
Thể tích định mức	250,0 mL
Aliquot A (đuổi NH_3 bằng base dư)	10,0 mL
Số đọc tín hiệu bẫy NH_3	23,77 đơn vị
Nền tín hiệu bẫy (mẫu trắng)	1,55 đơn vị
Hệ số bẫy k_A	0,000197 mol NH_3 trên một đơn vị
Aliquot B (kết tủa bằng Ba^{2+} dư)	20,0 mL
Khối lượng $BaSO_4$ cân được	0,739 g
Mẫu trắng của phép cân $BaSO_4$	0,115 g
Hiệu suất thu hồi của kênh $BaSO_4$	97%

Nhân hiệu suất của bẫy NH_3 đã rơi mất. Phòng thí nghiệm chỉ còn **hai** thẻ hiệu chuẩn có thể là của bẫy ấy: 90% và 95%. Cho $M_{NH_4Cl} = 53,5$, $M_{(NH_4)_2SO_4} = 132$, $M_{BaSO_4} = 233$ và $M_N = 14$ g/mol. Base và Ba^{2+} đều dư, phản ứng hoàn toàn, NH_3 không đến từ nguồn nào khác và chỉ sulfate tạo kết tủa. Hỏi: thẻ hiệu suất nào là thẻ của bẫy NH_3 , và phần trăm khối lượng nitrogen của mẫu bằng bao nhiêu?

- A. Thẻ 95% phần trăm nitrogen 15,3% B. Thẻ 95% phần trăm nitrogen 21,9%
 C. Thẻ 90% phần trăm nitrogen 23,1% D. Thẻ 90% phần trăm nitrogen 16,5%

Câu 7. Chuẩn độ 36,00 mL HCl bằng NaOH 0,18 M. Mẫu thật tiêu tốn 25,7 mL NaOH; phép thử trắng không có HCl tiêu tốn 0,7 mL. Giả sử mức tiêu hao do nền cũng có trong mẫu thật và cộng tuyến tính; phản ứng HCl–NaOH 1 : 1. Nồng độ HCl đã hiệu chỉnh bằng bao nhiêu?

- A. 0,125 M B. 0,2592 M C. 0,132 M D. 0,1285 M

Câu 8. Kim loại Al không tan trong HNO_3 đặc nguội vì

- A. HNO_3 đặc nguội là acid yếu nên không phản ứng
 B. bị thụ động hoá, lớp oxide bền tạo ra ngăn phản ứng tiếp diễn
 C. nó đứng sau hydrogen trong dãy hoạt động hoá học
 D. nó không phản ứng với acid trong bất kì điều kiện nào

Câu 9. Cho cân bằng $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ có $\Delta_r H = -198$ kJ. Tăng nhiệt độ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều

- A. thuận, tức chiều toả nhiệt
 B. không chuyển dịch vì nhiệt độ không ảnh hưởng tới cân bằng
 C. nghịch, tức chiều thu nhiệt
 D. nghịch, và giá trị K_C giữ nguyên

Câu 10. Theo thuyết Brønsted - Lowry, HCl đóng vai trò acid vì nó

- A. phân li ra ion OH^- B. nhận thêm electron C. nhận proton H^+ D. cho proton H^+