

**ĐỀ THI THỬ TRỰC TUYẾN**

(Đề thi có 2 trang)

CUỐI KỲ 1 - NĂM HỌC 2026–2027**MÔN: HÓA HỌC - LỚP 11***Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề**Phát hành ngày 09/10/2026*

Họ và tên:

Số báo danh:

Mã đề: H11.CK1.058**PHẦN I. TRẮC NGHIỆM****Câu 1.** Khoáng vật pyrite có công thức hoá học là

- A. PbS B. FeS₂ C. BaSO₄ D. CaSO₄ · 2H₂O

Câu 2. Khi làm thí nghiệm với sulfuric acid đặc, bắt buộc phải

- A. Chỉ cần đứng xa bình acid một mét B. Đeo khẩu trang vải là đủ
C. Đeo kính bảo hộ, găng tay và mặc áo blouse D. Để tay trần cho dễ thao tác

Câu 3. Trên phổ hồng ngoại, tín hiệu đặc trưng của liên kết O – H trong phenol nằm trong vùng số sóng nào?

- A. 3600 – 3200 cm⁻¹ B. 3650 – 3200 cm⁻¹ C. 3300 – 2500 cm⁻¹ D. 3500 – 3300 cm⁻¹

Câu 4. Cân bằng $2\text{H}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}(g)$ đang ở trạng thái cân bằng thì chịu một tác động bên ngoài. Theo nguyên lý Le Chatelier, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều

- A. giữ nguyên vì cân bằng đã ổn định B. làm tăng tác động bên ngoài ấy
C. thuận, bất kể tác động là gì D. làm giảm tác động bên ngoài ấy

Câu 5. Cho Fe tác dụng hết với dung dịch H₂SO₄ loãng. Khí thoát ra là

- A. SO₂ B. H₂S C. H₂ D. O₂

Câu 6. Một dây chuyền tiếp xúc mô phỏng oxi hoá SO_2 theo $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ qua **hai tầng xúc tác** có làm nguội trung gian. Dòng khí đi theo đúng trình tự sau: feed $\rightarrow$ **tầng 1** $\rightarrow$ điểm chia: một phần b **bypass** thẳng xuống nút trộn, phần $1 - b$ đi qua **tầng 2** $\rightarrow$ nút trộn $\rightarrow$ **tháp hấp thụ SO_3** $\rightarrow$ khí thải. **Feed** mỗi giờ: 137 kmol SO_2 , 95 kmol O_2 và 4 kmol SO_3 (dòng hồi lưu). Độ chuyển hoá của mỗi tầng áp lên **đúng dòng SO_2 đi qua tầng ấy** nhánh bypass giữ nguyên thành phần tới nút trộn. Tháp hấp thụ chỉ giữ SO_3 , với hiệu suất riêng của từng chế độ; toàn bộ SO_3 hấp thụ được chuyển thành H_2SO_4 tinh khiết rồi pha thành dung dịch 94% về khối lượng. Lấy $M_{H_2SO_4} = 98$ g/mol.

Chế độ	X_1	Bypass b	X_2	Hiệu suất hấp thụ	Nhiệt ra tầng 1	Nhiệt ra tầng 2	Chi phí năng lượng
A	90%	17%	73%	99%	$622^\circ C$	$449^\circ C$	170
B	79%	16%	70%	98%	$577^\circ C$	$472^\circ C$	90
C	87%	33%	69%	99%	$625^\circ C$	$460^\circ C$	130
D	80%	32%	83%	96%	$632^\circ C$	$467^\circ C$	180

Hai cổng phải qua hết: nhiệt độ ra của **cả hai** tầng không vượt $625^\circ C$, và SO_2 phát thải không vượt 10,8 kmol mỗi giờ. Trong số chế độ còn lại, chọn chế độ cho **hiệu suất hấp thụ acid nhất** nếu hoà thì chọn chế độ tổn ít năng lượng hơn. Hỏi: chọn chế độ nào, và chế độ ấy cho bao nhiêu tấn dung dịch acid mỗi giờ?

- A.** Chế độ A – 14,00 tấn dung dịch acid mỗi giờ **B.** Chế độ C – 13,56 tấn dung dịch acid mỗi giờ
C. Chế độ B – 13,19 tấn dung dịch acid mỗi giờ **D.** Chế độ D – 12,92 tấn dung dịch acid mỗi giờ

PHẦN II. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 7. Dung dịch pha trong phòng thí nghiệm có $[H^+] = 10^{-12}$ M. Tính pH của mẫu.

Câu 8. Xác định số oxi hoá của nitrogen trong HNO_3 (nitric acid).

Câu 9. Xác định số oxi hoá của nitrogen trong phân tử ammonia NH_3 (trả lời kèm dấu).

Câu 10. Cho các chất: C_2H_4 , CO_2 , KCN , H_2SO_4 . Có bao nhiêu chất là hợp chất hữu cơ?