

**ĐỀ THI THỬ TRỰC TUYẾN**

(Đề thi có 3 trang)

CUỐI KỲ 1 - NĂM HỌC 2026–2027**MÔN: HÓA HỌC - LỚP 11***Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề**Phát hành ngày 31/10/2026*

Họ và tên:

Số báo danh:

Mã đề: H11.CK1.069**PHẦN I. TRẮC NGHIỆM****Câu 1.** Muối BaSO_4 (barium sulfate) được dùng để

- A. Làm chất cản quang khi chụp X-quang dạ dày và làm bột màu trắng
- B. Làm trong nước ở nhà máy cấp nước
- C. Làm phân kali cho các cây trồng kị chloride như thuốc lá, cây ăn quả
- D. Tạo thành trên bản cực của ắc quy chì khi phóng điện

Câu 2. Ammonia thể hiện tính base là nhờ

- A. nhóm OH có sẵn trong phân tử ammonia
- B. cặp electron chưa liên kết trên nguyên tử nitrogen nhận được proton H^+
- C. số oxi hoá -3 của nitrogen
- D. ba nguyên tử hydrogen trong phân tử tách ra thành H^+

Câu 3. Trước khi chuẩn độ, buret cần được tráng bằng

- A. dung dịch acid cần xác định nồng độ
- B. nước cất rồi dùng ngay
- C. chính dung dịch chuẩn sẽ đựng trong buret
- D. dung dịch phenolphthalein

Câu 4. Chất nào sau đây là hydrocarbon?

- A. CH_3COCH_3
- B. $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$
- C. C_2H_2
- D. CH_3NH_2

Câu 5. Chuẩn độ 38,00 mL HCl bằng NaOH 0,06 M. Mẫu thật tiêu tốn 27,8 mL NaOH; phép thử trắng không có HCl tiêu tốn 0,8 mL. Giả sử mức tiêu hao do nền cũng có trong mẫu thật và cộng tuyến tính; phản ứng HCl–NaOH 1 : 1. Nồng độ HCl đã hiệu chỉnh bằng bao nhiêu? (làm tròn đến 4 chữ số thập phân).

- A. 0,0426 M
- B. 0,0452 M
- C. 0,0844 M
- D. 0,0439 M

Câu 6. Một mẻ chất rắn hữu cơ thô gồm sản phẩm P và hai tạp chất X, Y cần được tinh chế bằng **kết tinh lại**. Phòng thí nghiệm có hai dung môi ứng viên S_1 (methanol) và S_2 (propan-2-ol).

Chất trong mẻ thô	P (sản phẩm)	X (tạp)	Y (tạp)
Khối lượng (g)	6, 9	2, 1	1, 1

Độ tan, tính bằng gam chất tan trong 100 mL dung môi: s_h đo ở nhiệt độ sôi của dung môi, s_c đo ở $5^\circ C$.

Chất	$S_1: s_h$	$S_1: s_c$	$S_2: s_h$	$S_2: s_c$
P	18, 5	3, 4	26, 0	16, 9
X	3, 1	1, 2	27, 0	23, 5
Y	7, 0	3, 9	14, 5	11, 5

Mô hình dùng cho mọi tính toán. Với thể tích dung môi V (mL): khi đun sôi, mỗi chất tan tối đa $s_h V/100$ gam, phần không tan được **lọc nóng** bỏ đi; làm nguội về $5^\circ C$, mỗi chất **giữ lại trong nước cái** tối đa $s_c V/100$ gam, phần vượt kết tinh. Ba chất không tương tác, không kết tinh kèm nhau, không ngậm dung môi; mọi cân bằng đạt hoàn toàn. **Rửa tinh thể** bằng $V_w = 5, 0$ mL dung môi **lạnh mới**: mỗi chất trong tinh thể mất thêm tối đa $s_c V_w/100$ gam. Gọi khối lượng tinh thể sau rửa của mỗi chất là c'_P, c'_X, c'_Y thu hồi $R = c'_P/m_P$, độ tinh khiết $U = c'_P/(c'_P + c'_X + c'_Y)$. **Bốn điều kiện của quy trình.** V là bội của 5 mL và $10 \leq V \leq 60$ mL; khi đun sôi phải hoà tan được ít nhất 65% khối lượng P (tức ít nhất 4, 49 g); sau rửa phải có $R \geq 58\%$ và $U \geq 89, 0\%$. Trong các phương án đạt cả bốn điều ấy, lấy phương án **ít dung môi nhất**. **Hai phép thử vi mô đã làm.** Cân đúng 1/10 khối lượng mỗi chất của mẻ thô rồi lặp lại đúng quy trình trên – hoà tan sôi, lọc nóng, làm nguội $5^\circ C$, lọc lấy tinh thể – nhưng **không rửa**, với $V_{t1} = 2, 5$ mL S_1 và $V_{t2} = 1, 5$ mL S_2 . Mỗi phân đoạn (tinh thể C , nước cái M) được hoà tan thành đúng 10, 0 mL rồi chấm 1, 0 μL lên bản mỏng, nên **mỗi gam** chất có trong phân đoạn cho 100 μg chất ấy trên vết. Vết chỉ hiện khi lượng chất trên vết vượt ngưỡng phát hiện $\tau = 2, 0 \mu g$ đậm nhạt của vết **không** đọc ra được số liệu định lượng.

Lane	R_f của các vết hiện lên
chuẩn P	0, 35
chuẩn X	0, 60
chuẩn Y	0, 85
C_1 – tinh thể, thử với S_1	0, 35 0, 60
M_1 – nước cái, thử với S_1	0, 35 0, 60 0, 85
C_2 – tinh thể, thử với S_2	0, 35
M_2 – nước cái, thử với S_2	0, 35 0, 60 0, 85

Thẻ an toàn của hai dung môi.

Dung môi	Nhiệt độ sôi	Nguy hại	Kiểm soát bắt buộc
S_1 – methanol	$65^\circ C$	dễ cháy và độc, hơi gây hại thần kinh thị giác	làm trong tủ hút, đun cách thủy
S_2 – propan-2-ol	$82^\circ C$	dễ cháy	đun cách thủy, không để lửa trần trong phòng

Hỏi: phương án nào dưới đây là phương án đúng của quy trình?

- A. Dùng S_2 với $V = 30$ mL
C. Dùng S_1 với $V = 40$ mL

- B. Dùng S_2 với $V = 25$ mL
D. Dùng S_1 với $V = 30$ mL

PHẦN II. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 7. Cho cân bằng $2\text{NO}(g) + \text{O}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(g)$ với $\Delta_r H = -114 \text{ kJ}$. Số mol khí thay đổi bao nhiêu khi phản ứng chạy theo chiều thuận?

Câu 8. Tính phần trăm khối lượng của carbon trong C_2H_4 (ethylene).

Câu 9. Cho các nguồn sau: nhà máy nhiệt điện đốt than; máy phát điện chạy dầu diesel; quang hợp của cây xanh; hoà tan đường vào nước ở nhiệt độ thường. Có bao nhiêu nguồn phát thải NO_x ?

Câu 10. Quỳ tím đổi màu quanh pH 6. Nước cam có pH ≈ 4 . Tính khoảng cách từ pH của dung dịch tới mốc đổi màu ấy.