



Phát hành ngày 26/09/2026

Mã đề: H10.GK1.086

--	--	--	--

--	--	--	--

PHẦN III. TỰ LUẬN

Câu 7. Một mẫu nickel đã làm giàu đồng vị chỉ chứa ba đồng vị ^{58}Ni , ^{60}Ni và ^{64}Ni . Phổ khối lượng của mẫu cho ba đỉnh; mọi ion đều mang một đơn vị điện tích dương nên hoành độ mỗi đỉnh chính là số khối của một đồng vị.

Đỉnh m/z	Cường độ hiển thị	Trạng thái đầu ghi
58	100	đã bão hoà, vượt thang đo
60	85	đọc được
64	34	đọc được

Đầu ghi chỉ đo tới 100 đơn vị cường độ tương đối: đỉnh nào vượt thang đo thì vẫn hiển thị đúng 100 và bị đánh dấu bão hoà, nên với đỉnh ấy con số hiển thị chỉ là **cận dưới** của cường độ thật. Ba đỉnh dùng cùng một hệ số đáp ứng, vì thế tỉ số cường độ của hai đỉnh **đọc được** đúng bằng tỉ số số nguyên tử của hai đồng vị ấy. Một phép đo độc lập (không dùng phổ khối) cho khối lượng nguyên tử trung bình của chính mẫu ấy bằng 59,43. Quy ước lấy khối lượng nguyên tử của mỗi đồng vị bằng số khối của nó, và độ phổ biến của ba đồng vị là **phần trăm số nguyên tử**, cộng lại bằng 100%. Bản báo cáo của phòng thí nghiệm ghi độ phổ biến của ^{58}Ni trong mẫu bằng 53,1%. Chỉ rõ vì sao chiều cao đỉnh bão hoà không dùng để định lượng được, tìm độ phổ biến của cả ba đồng vị, kiểm chứng lại bằng khối lượng nguyên tử trung bình, rồi cho biết báo cáo lệch bao nhiêu điểm phần trăm.

.....

.....

.....

Câu 8. Nguyên tử chlorine có kí hiệu Cl và số hiệu nguyên tử $Z = 17$. Viết cấu hình electron rồi cho biết nguyên tử ấy có bao nhiêu lớp electron.

.....

.....

.....