



ĐỀ THI THỬ TRỰC TUYẾN

(Đề thi có 1 trang)

GIỮA KỲ 1 - NĂM HỌC 2026–2027

MÔN: TOÁN - LỚP 12

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

Phát hành ngày 13/09/2026

Họ và tên:

Số báo danh:

Mã đề: T12.GK1.117

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = (6; 6; 7)$. Giá trị $|\vec{u}|^2$ bằng

- A. 121 B. 252 C. 11 D. 361

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (0; 3; -1)$ và $\vec{v} = (3; 1; 0)$. Tọa độ của vectơ $2\vec{u} - \vec{v}$ là:

- A. $(-3; 4; -1)$ B. $(3; 7; -2)$ C. $(-3; 5; -2)$ D. $(6; -1; 1)$

Câu 3. Một doanh nghiệp bán sản phẩm với giá p thì lượng cầu là $q(p) = 145 - 5p$. Chi phí biến đổi là 7 trên mỗi sản phẩm và chi phí cố định là 60. Giá bán tối ưu là

- A. 11 B. 7 C. 36 D. 18

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (-2; -2; 4)$ và $\vec{v} = (-1; 2; -1)$. Tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng:

- A. 2 B. -6 C. -2 D. 0

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x) = 3x^3 - 18x^2 + 27x - 1$ có đồ thị (C) . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đường thẳng $y = m$ cắt (C) tại ba điểm phân biệt?

- A. 11 B. 12 C. 10 D. 13

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 6. Cho hàm số $y = \frac{3x+2}{2x-2}$. Gọi x_0 là hoành độ tiệm cận đứng và y_0 là tung độ tiệm cận ngang. Tính $x_0 + y_0$.

.....

.....

.....

Câu 7. Hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 24x + 1$ nghịch biến trên khoảng $(m; n)$. Tính $m + n$.

.....

.....

.....