



ĐỀ THI THỬ TRỰC TUYẾN

(Đề thi có 1 trang)

GIỮA KỲ 1 - NĂM HỌC 2026–2027

MÔN: TOÁN - LỚP 12

Thời gian làm bài: **60 phút**, không kể thời gian phát đề

Phát hành ngày 16/09/2026

Họ và tên:

Số báo danh:

Mã đề: T12.GK1.190

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Một hình chữ nhật có diện tích 5041. Chu vi nhỏ nhất của hình chữ nhật bằng

- A. 213 B. 10082 C. 286 D. 284

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{4x-6}{3x-2}$. Giá trị $ad - bc$ quyết định dấu của đạo hàm bằng

- A. 0 B. 10 C. -10 D. -26

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 4$ có đồ thị (C) . Tịnh tiến hệ trục tọa độ về gốc mới $I(1; -4)$ theo công thức $X = x - 1, Y = y + 4$. Trong hệ trục mới, hàm số có phương trình

- A. $Y = X^3 - X$ B. $Y = X^3 + 2X$ C. $Y = X^3 + X$ D. $Y = X^3 - X - 4$

Câu 4. Giá trị cực tiểu của hàm số $y = x^3 - 3x - 4$ bằng bao nhiêu?

- A. 2 B. -2 C. -6 D. 1

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho ba vectơ $\vec{u} = (3; 0; -2)$, $\vec{v} = (-2; 0; -1)$ và $\vec{a} = (-5; 0; 1)$ thỏa mãn $\vec{a} = x\vec{u} + y\vec{v}$. Tính $x + y$.

.....

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x) = -2x^3 + 6x^2 - 4$ có đồ thị (C) . Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m để đường thẳng $y = m$ cắt (C) tại ba điểm phân biệt.

.....

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (3; -3; 0)$ và $\vec{v} = (1; 0; -1)$. Tính $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

.....

