

**ĐỀ THI THỬ TRỰC TUYẾN**

(Đề thi có 2 trang)

**GIỮA KỲ 1 - NĂM HỌC 2026–2027****MÔN: VẬT LÝ - LỚP 12***Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề**Phát hành ngày 30/09/2026*

Họ và tên: .....

Số báo danh: .....

**Mã đề: L12.GK1.010****TRẮC NGHIỆM****Câu 1.** Nhiệt nóng chảy riêng của một chất là nhiệt lượng cần cung cấp để

- A. cả khối chất chuyển hoàn toàn sang thể lỏng.
- B. một kilôgam chất lỏng ấy chuyển hoàn toàn thành hơi.
- C. một kilôgam chất ấy ở nhiệt độ nóng chảy chuyển hoàn toàn sang thể lỏng.
- D. một kilôgam chất ấy nóng thêm một độ.

**Câu 2.** Không độ tuyệt đối trong thang Kelvin ứng với nhiệt độ Celsius

- A.  $-273^{\circ}\text{C}$
- B.  $-100^{\circ}\text{C}$
- C.  $0^{\circ}\text{C}$
- D.  $273^{\circ}\text{C}$

**Câu 3.** Trong thí nghiệm đo nhiệt dung riêng bằng cách cấp nhiệt bằng điện, dụng cụ nào dùng để giữ cho hệ cách nhiệt với môi trường?

- A. Nhiệt lượng kế.
- B. Cân điện tử.
- C. Nhiệt kế.
- D. Oát kế.

**Câu 4.** Trong tình huống nào sau đây, nội năng của vật thay đổi bằng cách thực hiện công?

- A. Nhúng thìa kim loại vào cốc nước nóng.
- B. Phơi tẩm kim loại dưới nắng.
- C. Hơ tay lên phía trên ngọn lửa.
- D. Phanh gấp làm má phanh nóng lên.

**Câu 5.** Chuyển động Brown chứng tỏ điều gì?

- A. Hạt phấn hoa cũng là một phân tử.
- B. Nhiệt độ của chất lỏng luôn thay đổi.
- C. Chất lỏng có lực đẩy rất mạnh giữa các phân tử.
- D. Các phân tử của chất lỏng chuyển động hỗn loạn không ngừng.

**Câu 6.** Trộn 5 kg nước ở  $85^{\circ}\text{C}$  với 3 kg nước ở  $28^{\circ}\text{C}$ , bỏ qua hao phí ra môi trường. Nhiệt độ khi cân bằng nhiệt bằng (làm tròn đến hàng phần mười).

- A.  $56,5^{\circ}\text{C}$
- B.  $63,6^{\circ}\text{C}$
- C.  $49,4^{\circ}\text{C}$
- D.  $85^{\circ}\text{C}$

**Câu 7.** Nhiệt dung riêng của một chất là nhiệt lượng cần cung cấp để

- A. một kilôgam chất ấy chuyển hoàn toàn sang thể lỏng.
- B. cả vật nóng thêm một độ.
- C. một kilôgam chất ấy nóng thêm một độ.
- D. một kilôgam chất ấy nóng thêm một trăm độ.

**Câu 8.** Thả một miếng đồng khối lượng 750 g ở  $110^{\circ}\text{C}$  vào 2000 g nước ở  $23^{\circ}\text{C}$  trong một bình cách nhiệt; nhiệt dung riêng của nước là  $4200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ . Nhiệt độ khi cân bằng đo được  $25,9^{\circ}\text{C}$ . Nhiệt dung riêng của đồng bằng

- A.  $32 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$       B.  $4200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$       C.  $380 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$       D.  $330105 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$

**Câu 9.** Quá trình chuyển thể nào diễn ra từ thể rắn thẳng sang thể khí?

- A. Hoá hơi.      B. Thăng hoa.      C. Ngưng tụ.      D. Đông đặc.

**Câu 10.** Một khối khí nhận nhiệt lượng 160 J và giãn nở, thực hiện công 100 J lên môi trường. Nội năng của khối khí biến thiên

- A. 260 J      B. 160 J      C.  $-60 \text{ J}$       D. 60 J