



## ĐỀ THI THỬ TRỰC TUYẾN

(Đề thi có 2 trang)

GIỮA KỲ 1 - NĂM HỌC 2026–2027

MÔN: VẬT LÝ - LỚP 12

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

Phát hành ngày 24/10/2026

Họ và tên: .....

Số báo danh: .....

Mã đề: L12.GK1.022

## TRẮC NGHIỆM

**Câu 1.** Nội năng của một vật là

- A. tổng động năng chuyển động nhiệt của các phân tử và thế năng tương tác giữa chúng.
- B. nhiệt lượng mà vật nhận được từ bên ngoài.
- C. động năng của cả vật khi vật chuyển động.
- D. thế năng của vật trong trọng trường.

**Câu 2.** So với nhiệt lượng cần đun một kilôgam nước từ  $0^\circ\text{C}$  lên  $100^\circ\text{C}$ , nhiệt lượng cần để hoá hơi hoàn toàn kilôgam nước ấy

- A. lớn hơn khoảng năm lần.
- B. nhỏ hơn khoảng năm lần.
- C. nhỏ hơn khoảng hai lần.
- D. bằng nhau.

**Câu 3.** Vật nhỏ nguội trong phòng giữ  $T_{mt} = 15^\circ\text{C}$ . Ban đầu  $T_0 = 99^\circ\text{C}$  sau  $t_1 = 14$  phút đo được  $T_1 = 43^\circ\text{C}$ . Dùng  $T(t) = T_{mt} + (T_0 - T_{mt})e^{-t/\tau}$ ,  $\tau > 0$  và  $t$  theo phút; không đổi pha, nhiệt độ phòng không đổi. Tính hằng số thời gian  $\tau$  theo phút (làm tròn đến hàng phần mười).

- A. 14 phút
- B. 4, 2 phút
- C. 38, 2 phút
- D. 12, 7 phút

**Câu 4.** Định luật I của nhiệt động lực học được viết là

- A.  $\Delta U = A - Q$
- B.  $\Delta U = A + Q$
- C.  $\Delta U = A \cdot Q$
- D.  $A = \Delta U + Q$

**Câu 5.** Chất lỏng đang sôi ở áp suất không đổi; hai lần đun cùng điều kiện có  $P_1 = 2250\text{ W}$ ,  $P_2 = 2950\text{ W}$ . Khối lượng giảm đều với  $r_1 = 0,5\text{ g/s}$ ,  $r_2 = 0,7\text{ g/s}$ . Bỏ giọt bắn; nhiệt độ chất lỏng không đổi. Thất thoát môi trường  $H$  là cùng một hằng số ở hai lần, với  $P_i - H = Lr_i$  khi  $r$  theo kilôgam trên giây. Tính nhiệt hóa hơi riêng theo megajun trên kilôgam.

- A. 4, 5 MJ/kg
- B. 3500 MJ/kg
- C. 0, 58 MJ/kg
- D. 3, 5 MJ/kg

**Câu 6.** Một khối nước đá khối lượng 2 kg ở  $-11^\circ\text{C}$  nhiệt dung riêng của nước đá là  $2100\text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ , nhiệt nóng chảy riêng là  $340 \cdot 10^3\text{ J/kg}$ . Nhiệt lượng cần cung cấp để khối nước đá ấy nóng chảy hoàn toàn bằng (làm tròn đến hàng đơn vị).

- A. 634 kJ
- B. 680 kJ
- C. 726 kJ
- D. 46 kJ

**Câu 7.** Nhiệt dung riêng của một chất là nhiệt lượng cần cung cấp để

- A. một kilôgam chất ấy nóng thêm một trăm độ.
- B. một kilôgam chất ấy nóng thêm một độ.
- C. một kilôgam chất ấy chuyển hoàn toàn sang thể lỏng.
- D. cả vật nóng thêm một độ.

**Câu 8.** Ở thể lỏng, các phân tử của chất

- A. phân tử sát nhau, dao động quanh vị trí cân bằng cố định.
- B. phân tử ở rất xa nhau và chuyển động tự do.
- C. đứng yên hoàn toàn, không chuyển động.
- D. phân tử gần nhau nhưng vị trí cân bằng dịch chuyển được.

**Câu 9.** Vì sao thức ăn trong nồi áp suất chín nhanh hơn trong nồi thường?

- A. Vì hơi nước trong nồi không thoát ra nên nước không cạn.
- B. Vì nồi áp suất dẫn nhiệt tốt hơn nồi thường.
- C. Vì áp suất cao làm nước sôi ở nhiệt độ trên  $100^{\circ}\text{C}$ .
- D. Vì nước trong nồi áp suất sôi ở nhiệt độ thấp hơn.

**Câu 10.** Loại nhiệt kế nào đo nhiệt độ dựa vào suất điện động sinh ra khi hai mối hàn khác nhiệt độ?

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| A. Nhiệt kế cặp nhiệt điện. | B. Nhiệt kế điện trở.   |
| C. Nhiệt kế thủy ngân.      | D. Nhiệt kế hồng ngoại. |