


**ĐỀ THI THỬ TRỰC TUYẾN**

(Đề thi có 2 trang)

**GIỮA KỲ 1 - NĂM HỌC 2026–2027**
**MÔN: VẬT LÝ - LỚP 12**

 Thời gian làm bài: **45 phút**, không kể thời gian phát đề

Phát hành ngày 26/10/2026

Họ và tên: .....

Số báo danh: .....

**Mã đề: L12.GK1.089**
**PHẦN I. TRẮC NGHIỆM**

**Câu 1.** Cần hạ nhiệt độ 0,8 kg nước từ 60 °C xuống 35 °C bằng cách thả nước đá ở 0 °C vào; nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là  $340 \cdot 10^3$  J/kg, nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(kg · K). Bình cách nhiệt tốt, bỏ qua nhiệt dung của bình và hao phí ra môi trường. Khối lượng nước đá cần dùng bằng (làm tròn đến hàng phần trăm).

- A. 0,17 kg                      B. 0,25 kg                      C. 0,4 kg                      D. 0,57 kg

**Câu 2.** Nhiệt độ 25 °C ứng với nhiệt độ Fahrenheit bằng

- A. 45 °F                      B. 57 °F                      C. 77 °F                      D. –3,9 °F

**Câu 3.** Một khối nước đá khối lượng 5 kg có nhiệt dung riêng 2100 J/(kg · K). Nhiệt lượng cần cung cấp để khối ấy nóng thêm 31 °C bằng (làm tròn đến hàng đơn vị).

- A. 11 kJ                      B. 65 kJ                      C. 325500 kJ                      D. 326 kJ

**Câu 4.** Phương trình cân bằng nhiệt của một hệ cách nhiệt được viết là

- A.  $Q_{\text{toả}} = mc\Delta t$  của riêng vật lạnh                      B.  $Q_{\text{toả}} = Q_{\text{thu}}$   
 C.  $Q_{\text{toả}} + Q_{\text{thu}} = 0$  với cả hai đều dương                      D.  $Q_{\text{toả}} = 2Q_{\text{thu}}$

**PHẦN II. TRẢ LỜI NGẮN**

**Câu 5.** Vật nhỏ nguội trong phòng giữ  $T_{mt} = 30^\circ\text{C}$ . Ban đầu  $T_0 = 126^\circ\text{C}$  sau  $t_1 = 12$  phút đo được  $T_1 = 78^\circ\text{C}$ . Dùng  $T(t) = T_{mt} + (T_0 - T_{mt})e^{-t/\tau}$ ,  $\tau > 0$  và  $t$  theo phút; không đổi pha, nhiệt độ phòng không đổi. Tính hằng số thời gian  $\tau$  theo phút (làm tròn đến hàng phần mười).

   

**Câu 6.** Đun mẫu 1 kg trong bình có nhiệt dung 300 J/K. Cả bình và mẫu tăng nhiệt độ 4 K, nhận tổng 3600 J; bỏ thất thoát, không chuyển thể. Nhiệt dung riêng của mẫu là bao nhiêu J/(kg·K)?

   
**PHẦN III. TỰ LUẬN**

**Câu 7.** Khoảng cách trung bình giữa các phân tử của một khối chất tăng 7 lần. Hỏi thể tích khối chất tăng bao nhiêu lần?

.....

.....

.....

**Câu 8.** Một lượng axeton khối lượng 8,8 kg đang ở đúng nhiệt độ sôi  $56\text{ }^{\circ}\text{C}$  nhiệt hoá hơi riêng của axeton là  $520 \cdot 10^3\text{ J/kg}$ . Tính nhiệt lượng cần cung cấp để lượng chất ấy hoá hơi hoàn toàn, theo kilôjun.

.....

.....

.....