

**ĐỀ THI THỬ TRỰC TUYẾN**

(Đề thi có 1 trang)

GIỮA KỲ 1 - NĂM HỌC 2026–2027**MÔN: VẬT LÝ - LỚP 12***Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề**Phát hành ngày 18/09/2026*

Họ và tên:

Số báo danh:

Mã đề: L12.GK1.106**PHẦN I. TRẮC NGHIỆM****Câu 1.** Nhiệt độ -35°C ứng với nhiệt độ tuyệt đối bằng

- A. 308 K B. -35 K C. -308 K D. 238 K

Câu 2. Một khối sắt khối lượng 4 kg đang ở đúng nhiệt độ nóng chảy 1538°C nhiệt nóng chảy riêng của sắt là $277 \cdot 10^3\text{ J/kg}$. Nhiệt lượng cần cung cấp để khối ấy nóng chảy hoàn toàn bằng

- A. 277 kJ B. 1108 kJ C. 69 kJ D. 1108000 kJ

Câu 3. So với nhiệt lượng cần đun một kilôgam nước từ 0°C lên 100°C , nhiệt lượng cần để hoá hơi hoàn toàn kilôgam nước ấy

- A. bằng nhau. B. lớn hơn khoảng năm lần.
C. nhỏ hơn khoảng hai lần. D. nhỏ hơn khoảng năm lần.

Câu 4. Một mẫu khí nitơ (N_2) có khối lượng 16 g khối lượng mol của nó là 28 g/mol , lấy $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}\text{ mol}^{-1}$. Số phân tử có trong mẫu, tính theo đơn vị 10^{23} , bằng (làm tròn đến hàng phần mười).

- A. 3,4 B. 0,6 C. 3440 D. 10,5

Câu 5. Nhiệt lượng một vật thu vào khi nóng lên được tính bằng

- A. $Q = \frac{c\Delta t}{m}$ B. $Q = \frac{m\Delta t}{c}$ C. $Q = mc\Delta t$ D. $Q = mc$

PHẦN II. TỰ LUẬN**Câu 6.** Thả một miếng bạc khối lượng 600 g ở 230°C vào 1100 g nước ở 28°C trong một bình cách nhiệt; nhiệt dung riêng của nước là $4200\text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$. Biết nhiệt dung riêng của bạc là $230\text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$. Tính nhiệt độ khi cân bằng nhiệt (làm tròn đến hàng phần mười).

.....

.....

.....

Câu 7. Khoảng cách trung bình giữa các phân tử của một khối chất tăng 8 lần. Hỏi thể tích khối chất tăng bao nhiêu lần?

.....

.....

.....