

**ĐỀ THI THỬ TRỰC TUYẾN**

(Đề thi có 4 trang)

**CHƯƠNG TRÌNH L10,L11 + HỌC KỲ 1 LỚP 12 - NĂM  
HỌC 2026–2027****MÔN: HÓA HỌC - THPT***Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề**Phát hành ngày 07/08/2026*

Họ và tên: .....

Số báo danh: .....

**Mã đề: H.CC1.055****TRẢ LỜI NGẮN**

**Câu 1.** Oxide cao nhất của bromine là  $\text{Br}_2\text{O}_7$ . Cho nguyên tử khối:  $\text{Br} = 80$ ,  $\text{O} = 16$ . Tính phần trăm khối lượng của bromine trong oxide ấy (làm tròn đến hàng phần mười).

**Câu 2.** Cho glucose phản ứng hết với nước bromine, thu được 98 g gluconic acid ( $M = 196$ ). Tính khối lượng glucose ( $M = 180$ ) đã dùng, theo gam.

**Câu 3.** Chuẩn độ 10 mL dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  0,5 M bằng dung dịch  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  0,25 M. Tính thể tích dung dịch chuẩn cần dùng tới điểm tương đương.

**Câu 4.** Sản phẩm chính của phản ứng giữa but-1-ene và  $\text{HBr}$  là 2-bromobutane. Trong một phân tử sản phẩm ấy có bao nhiêu nguyên tử hydrogen?

**Câu 5.** Khi tạo một liên kết peptide, hai gốc amino acid tách ra bao nhiêu phân tử nước?

**Câu 6.** Một mẫu chuẩn **chỉ chứa** diglycine  $G_2$  (Gly–Gly), triglycine  $G_3$  (Gly–Gly–Gly) và một lượng tạp **trơ** đã cân riêng. Cho  $Gly = 75$ ,  $H_2O = 18$ . Hai aliquot lấy từ **cùng một** dung dịch mẫu được đo bằng hai cách: **Biuret** (đo trước khi thủy phân). Phản ứng biuret đòi phân tử có **từ hai liên kết peptide trở lên**, nên trong bộ mẫu này chỉ  $G_3$  cho tín hiệu;  $G_2$  và tạp trơ nằm trong nền đã trừ. Tín hiệu sau khi trừ mẫu trắng bằng hiệu suất thu hồi nhân  $k_B$  nhân số mmol  $G_3$  **trong aliquot**. **Thủy phân hoàn toàn rồi đếm glycine**. Một mol  $G_2$  cho 2 mol glycine, một mol  $G_3$  cho 3 mol glycine. Số đọc sau khi trừ mẫu trắng nhân  $k_H$  cho số mmol glycine **bắt được** chia hiệu suất thu hồi mới ra lượng thật trong aliquot.

| Đại lượng                                | Giá trị                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Khối lượng mẫu đã cân                    | 158,6 mg                            |
| Khối lượng tạp trơ trong mẫu (cân riêng) | 30,8 mg                             |
| Thể tích dung dịch mẫu                   | 250 mL                              |
| Aliquot đem đo biuret                    | 25 mL                               |
| Số đọc biuret của aliquot ấy             | 1,766                               |
| Số đọc biuret của mẫu trắng              | 0,147                               |
| Hệ số chuẩn biuret $k_B$                 | 34,7 đơn vị hấp thụ trên mỗi mmol   |
| Hiệu suất thu hồi của phép biuret        | 97,4%                               |
| Aliquot đem thủy phân                    | 10 mL                               |
| Số đọc assay amino acid                  | 127,8 đơn vị                        |
| Số đọc assay của mẫu trắng               | 19,6 đơn vị                         |
| Hệ số assay $k_H$                        | 0,0007 mmol glycine trên mỗi đơn vị |
| Hiệu suất thu hồi của phép assay         | 94,6%                               |

Hỏi: số liên kết peptide **trung bình trên một phân tử peptide** trong mẫu bằng bao nhiêu? (làm tròn half-up đến 0,01)

   

**Câu 7.** Thời gian phân huỷ ước tính của vỏ lon nhôm là bao nhiêu năm?

   

**Câu 8.** Cây xanh quang hợp tạo 243 g tinh bột (mắt xích  $M = 162$ ). Tính số mol  $CO_2$  cây đã hấp thụ.

   

**Câu 9.** Cho 74,4 g aniline ( $M = 93$ ) tác dụng hết với nước bromine. Tính số mol kết tủa 2,4,6-tribromoaniline thu được.

   

**Câu 10.** Một mẫu amylose có 8000 mắt xích. Hỏi khi thủy phân hoàn toàn một phân tử ấy thu được bao nhiêu phân tử glucose?

**Câu 11.** Trên sơ đồ năng lượng của phản ứng trung hoà acid mạnh bằng base mạnh ( $\text{HCl}(aq) + \text{NaOH}(aq) \rightarrow \text{NaCl}(aq) + \text{H}_2\text{O}(l)$ ), mức năng lượng của các chất đầu là 10 kJ, của các sản phẩm là  $-47$  kJ. Biến thiên enthalpy của phản ứng bằng bao nhiêu kJ? (trả lời kèm dấu).

**Câu 12.** Tính số mol nitrobenzene ( $M = 123$ ) có trong 86,1 g chất ấy.

**Câu 13.** Cho các polymer: poly(ethylene terephthalate), amylopectin, cao su thiên nhiên, cao su lưu hoá. Có bao nhiêu polymer có mạch không phân nhánh?

**Câu 14.** Điện phân điều chế Zn ( $A = 65$ ,  $n = 2$ ) với cường độ 2 A trong 7720 giây, hiệu suất 90%. Tính khối lượng kim loại thu được, theo gam.

**Câu 15.** Hoà tan  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  vào nước được dung dịch nồng độ 0,4 M. Chất ấy là chất điện li mạnh, phương trình điện li:  $\text{Ba}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^-$ . Tính nồng độ ion  $\text{Ba}^{2+}$  trong dung dịch.

**Câu 16.** Nhiệt độ sôi của formaldehyde ( $\text{HCHO}$ ) bằng bao nhiêu độ C? (trả lời kèm dấu).

**Câu 17.** Cho các ion  $\text{Na}^+$ ,  $\text{CH}_3\text{COO}^-$ ,  $\text{NO}_3^-$ ,  $\text{SO}_4^{2-}$ . Có bao nhiêu ion **không** bị thuỷ phân trong nước?

**Câu 18.** Phenol nóng chảy ở nhiệt độ bao nhiêu độ C?

**Câu 19.** Mỗi lần giặt dùng 50 g bột giặt chứa 10% khối lượng phosphate. Tính khối lượng phosphate thải ra sau một lần giặt, theo gam.

**Câu 20.** Lên men một dung dịch glucose:  $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{men}} 2C_2H_5OH + 2CO_2 \uparrow$ . Xưởng kiểm toán hiệu suất bằng hai phép đo độc lập: một theo lượng  $CO_2$  thoát ra, một theo lượng ethanol chưng được. Số liệu:

| Đại lượng đo                               | Giá trị    |
|--------------------------------------------|------------|
| Khối lượng dung dịch lên men               | 1273 g     |
| Phần trăm khối lượng glucose               | 13,6%      |
| Thể tích khí ẨM thu được                   | 36,33 L    |
| Áp suất tổng của khí thu                   | 99,6 kPa   |
| Áp suất hơi nước ở nhiệt độ thu khí        | 4,6 kPa    |
| Nhiệt độ thu khí                           | 298 K      |
| Lượng $CO_2$ còn hoà tan trong dịch        | 0,088 mol  |
| Thể tích phần lỏng chưng ra                | 77,3 mL    |
| Khối lượng riêng phần lỏng ấy              | 0,853 g/mL |
| Phần khối lượng ethanol trong phần lỏng ấy | 93,1%      |

Cho  $R = 8,314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$  dùng với áp suất theo kPa và thể tích theo L;  $C_6H_{12}O_6 = 180$ ,  $C_2H_5OH = 46$ . Khí thu chỉ gồm  $CO_2$  và hơi nước. Hỏi: hai hiệu suất tính theo hai kênh đo lệch nhau bao nhiêu **điểm phần trăm**?