

**ĐỀ THI THỬ TRỰC TUYẾN**

(Đề thi có 3 trang)

CHƯƠNG TRÌNH L10,L11 + GIỮA KỲ 1 LỚP 12 - NĂM HỌC 2026–2027**MÔN: TOÁN - THPT***Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề**Phát hành ngày 05/09/2026*

Họ và tên:

Số báo danh:

Mã đề: T.CG1.086**ĐÚNG/SAI****Câu 1.** Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2 - 13x + 42}{x - 6}$ với $x \neq 6$.

- a) Mọi hàm đa thức đều liên tục trên toàn trục số.
- b) Giá trị cần gán cho $f(6)$ bằng 0.
- c) Điểm $x = 6$ là điểm gián đoạn không bỏ được của f .
- d) Một hàm có giới hạn tại một điểm thì liên tục tại điểm ấy.


Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = (-2; -4; -4)$ và $\vec{v} = (-4; -5; -2)$.

- a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 36$.
- b) $2\vec{u}$ có tọa độ $(-4; -8; -8)$.
- c) Tích vô hướng của hai vectơ là một vectơ.
- d) $\vec{u} \perp \vec{v}$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x - 2$ có đồ thị (C) . Xét đường thẳng $y = m$ với m là tham số thực.

- a) Hàm số đạt cực đại tại $x = -1$.
- b) Với mọi m thực, đường thẳng $y = m$ luôn cắt (C) tại ba điểm phân biệt.
- c) Đồ thị (C) cắt trục tung tại điểm có tung độ -2 .
- d) Phương trình $f(x) = -6$ có đúng 2 nghiệm phân biệt.

Câu 4. Hình vẽ là đồ thị của hàm số bậc ba $y = f(x)$. Hai điểm cực trị của đồ thị được đánh dấu là $A(-2; -1)$ và $B(0; -5)$.



- a) Điểm cực đại của đồ thị là điểm A.
- b) Giá trị cực đại của hàm số bằng -2 .
- c) Phương trình $f(x) = -4$ có đúng 3 nghiệm thực.
- d) Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ -5 .

Câu 5. Một xưởng dùng chung một loại nguyên liệu để làm hai mặt hàng: mỗi tấn mặt hàng thứ nhất cần 5 phần nguyên liệu, mỗi tấn mặt hàng thứ hai cần 4 phần, xưởng chỉ có 20 phần. Gọi x, y (tấn, $x \geq 0, y \geq 0$) là khối lượng hai mặt hàng làm được và D là miền các cặp $(x; y)$ thỏa mãn ràng buộc nguyên liệu. Xét biểu thức $z = 2x + 4y$.

- a) Diện tích miền D bằng 20.
- b) Giá trị lớn nhất của z trên miền D bằng 20.
- c) Miền D chứa đúng 16 điểm có hai tọa độ nguyên không âm.
- d) Giá trị lớn nhất của $\min(x; y)$ trên miền D bằng $\frac{40}{9}$.

Câu 6. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 6}{x - 1}$.

- a) Hàm số xác định tại $x = 1$.
- b) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang.
- c) Đồ thị nhận giao hai tiệm cận làm tâm đối xứng.
- d) Phương trình $\frac{x^2 + 6}{x - 1} = 0$ có nghiệm thực.

Câu 7. Cho hàm số $y = x^3 + 9x^2 + 24x - 3$.

- a) $y' = 3x^2 + 18x + 24$.
- b) Hàm số đồng biến trên $(-4; -2)$.
- c) Giá trị cực đại của hàm số bằng -23 .
- d) Hàm số không có cực trị.

Câu 8. Một chất điểm chuyển động thẳng theo phương trình $s(t) = 2t^3 + 5t^2 + 12t$, trong đó s tính bằng mét và t tính bằng giây.

- a) Chất điểm chuyển động với gia tốc không đổi.
- b) Đạo hàm cấp hai của quãng đường là $s''(t) = 12t^2 + 10$.
- c) Tại thời điểm $t = 2$ giây, chất điểm có gia tốc 29 m/s^2 .
- d) Gia tốc của chất điểm dương tại mọi thời điểm $t > 0$.

Câu 9. Xét các giới hạn khi $x \rightarrow +\infty$ của các phân thức lập từ $8x^2 - 1$ và $2x^2 - 5x$.

- a) Mọi phân thức đều có giới hạn hữu hạn khi x ra vô cực.
- b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 1$.
- c) Giới hạn của một phân thức khi x ra vô cực chỉ phụ thuộc hai hệ số bậc cao nhất khi tử và mẫu cùng bậc.
- d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8x^2 - 1}{2x^2 - 5x}$ phụ thuộc vào -1 và -5 .

Câu 10. Cho hàm số $y = \cos 6x - 6$.

- a) Biên độ của hàm số bằng 1.
- b) Chu kì cơ sở của hàm số bằng 2π .
- c) Hiệu giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất bằng 1.
- d) Hằng số tự do trong biểu thức làm đồ thị tịnh tiến theo phương thẳng đứng.