


ĐỀ THI THỬ TRỰC TUYẾN

(Đề thi có 3 trang)

**CHƯƠNG TRÌNH L10, L11 + HỌC KỲ 1 LỚP 12 - NĂM
HOC 2026–2027**
MÔN: TOÁN - THPT

 Thời gian làm bài: **90 phút**, không kể thời gian phát đề

Phát hành ngày 10/08/2026

Họ và tên:

Số báo danh:

Mã đề: T.CC1.022
TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Giá trị cực tiểu của hàm số $y = x^3 - 12x + 9$ bằng bao nhiêu?

- A. -7 B. -25 C. 2 D. 25

Câu 2. Khối chóp cụt có diện tích hai đáy lần lượt là $S_1 = 16$ và $S_2 = 25$, chiều cao $h = 12$. Giá trị $\sqrt{S_1 S_2}$ bằng

- A. 9 B. 400 C. 41 D. 20

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-4; 1; 4)$ và $B(2; 3; 13)$. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB . Độ dài đoạn AM bằng

- A. 11 B. $5, 5$ C. $8, 5$ D. $60, 5$

Câu 4. Cho $f(x) = x^2 + 4x$. Giá trị $f''(5)$ bằng

- A. 14 B. 2 C. 0 D. 1

Câu 5. Một lớp có 23 học sinh. Có 15 học sinh tham gia câu lạc bộ A, 11 học sinh tham gia câu lạc bộ B và 6 học sinh tham gia cả hai. Số học sinh tham gia ít nhất một câu lạc bộ là

- A. 26 B. 14 C. 20 D. 23

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; -1; 1)$, $B(3; 0; -1)$ và $C(3; -5; 1)$. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CA}$ bằng:

- A. 30° B. 150° C. 45° D. 90°

Câu 7. Một mẫu số liệu ghép nhóm có $Q_1 = 13$ và $Q_3 = 21$. Khoảng tứ phân vị bằng

- A. 8 B. 21 C. 34 D. 4

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho ba vectơ $\vec{u} = (-4; -4; 1)$, $\vec{v} = (-2; 4; -4)$ và $\vec{w} = (4; 2; 0)$. Tọa độ của vectơ $\vec{t}$ thỏa mãn $\vec{t} - \vec{u} = \vec{v} + \vec{w}$ là:

- A. $(2; 6; -4)$ B. $(-2; 2; -3)$ C. $(-10; -2; -3)$ D. $(6; 10; -5)$

Câu 9. Khảo sát điểm kiểm tra môn Toán của 42 học sinh, kết quả ghi ở bảng sau.

Điểm	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)
Tần số	3	3	10	14	12

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào?

- A. $7, 45$ B. 5 C. $9, 13$ D. $1, 68$

Câu 10. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh 9. Góc giữa hai đường thẳng AB và AD bằng

- A. 60° B. 45° C. 0° D. 90°

Câu 11. Trong không gian, một đường thẳng và một mặt phẳng có thể có bao nhiêu điểm chung?

- A. luôn đúng 1 B. 0 hoặc 1 C. 1 hoặc 2 D. 0, 1 hoặc vô số

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(3; 2; 5)$, $B(0; -2; 0)$, $C(-6; -6; -2)$. Diện tích tam giác ABC bằng:

- A. $6\sqrt{6}$ B. $12\sqrt{6}$ C. 47 D. $5\sqrt{97}$

Câu 13. Trong mặt phẳng Oxy , hypebol $(H) : \frac{x^2}{784} - \frac{y^2}{441} = 1$ có độ dài trục thực bằng

- A. 28 B. 56 C. 784 D. 42

Câu 14. Hàm số $y = x^3 + 9x^2 + 24x + 5$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; -4)$ B. $(-4; -2)$ C. $(2; 4)$ D. $(-2; +\infty)$

Câu 15. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (6; -6; -3)$ và $\vec{v} = (1; 0; -1)$. Tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng:

- A. 6 B. 0 C. 9 D. 3

Câu 16. Khảo sát điểm kiểm tra môn Toán của 42 học sinh, kết quả ghi ở bảng sau.

Điểm	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)
Tần số	7	7	11	14	3

Trung vị của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào?

- A. 7, 64 B. 7, 48 C. 7 D. 7, 5

Câu 17. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = (3; -4; 12)$. Tổng ba toạ độ của $3\vec{u}$ bằng

- A. 33 B. 14 C. 39 D. 11

Câu 18. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{4x - 8}{3x - 1}$. Giá trị của hàm số tại $x = -1$ bằng

- A. $\frac{1}{3}$ B. 3 C. -2 D. $\frac{4}{3}$

Câu 19. Trong không gian $Oxyz$, cho bốn điểm $A(-1; 3; -3)$, $B(7; 2; -7)$, $C(-3; 2; 3)$, $D(-2; 1; 3)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$ là:

- A. $(8; -1; -4)$ B. $(-7; 0; 4)$ C. $(9; -2; -4)$ D. $(7; 0; -4)$

Câu 20. Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 7}{x + 3}$ cắt trục tung tại điểm có tung độ

- A. $\frac{7}{3}$ B. 7 C. 0 D. $-\frac{7}{3}$

Câu 21. Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối và phân biệt. Xác suất của biến cố đối của biến cố “hai con cùng số chấm” bằng

- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{5}{6}$ C. $\frac{29}{36}$ D. 5

Câu 22. Một đường đặc tính của bơm được mô tả bởi hàm số $f(x) = mx + n + \frac{r}{x-c}$, trong đó $m \neq 0$, $r \neq 0$ và c là một số nguyên. Đường tiệm cận **xiên** dọc được chính xác là $y = -3x + 10$ còn c chỉ biết thuộc tập $\{-2; -1; 0; 4; 7; 8\}$. Quan sát cho thấy nhánh bên trái đi xuống $-\infty$, nhánh bên phải đi lên $+\infty$. Bộ ghi lưu bốn điểm đo, trong đó **đúng ba** điểm nằm trên đường cong và một điểm bị ghi sai tung độ:

Điểm	M_1	M_2	M_3	M_4
x	-14	-3	1	12
y	50	6	15	-24

Bốn báo cáo được nộp, mỗi báo cáo nêu c , r , điểm bị ghi sai và hai đường tiệm cận. Báo cáo nào là báo cáo duy nhất đúng?

- A. $c = -2$, $r = 24$ điểm sai là M_2 tiệm cận đúng $x = -2$ và tiệm cận xiên $y = -3x + 10$
 B. $c = -1$, $r = 26$ điểm sai là M_3 tiệm cận đúng $x = -1$ và tiệm cận ngang $y = 10$
 C. $c = -1$, $r = 26$ điểm sai là M_3 tiệm cận đúng $x = -1$ và tiệm cận xiên $y = -3x + 10$
 D. $c = -1$, $r = -26$ điểm sai là M_3 tiệm cận đúng $x = -1$ và tiệm cận xiên $y = -3x + 10$

Câu 23. Cho $SA \perp (P)$ với $SA = 15$, điểm M nằm trong (P) và $AM = 8$. Góc giữa đường thẳng SM và mặt phẳng (P) là

- A. $\widehat{MAS}$ B. $\widehat{ASM}$ C. $\widehat{SMA}$ D. $\widehat{SAM}$

Câu 24. Cho $SA \perp (P)$ với $SA = 7$, điểm M nằm trong (P) và $AM = 24$. Độ dài SM bằng

- A. 17 B. 31 C. 25 D. 625

Câu 25. Đồ thị hàm số $y = -x^3 + 9x^2 - 15x - 31$ cắt trục tung tại điểm có tọa độ là:

- A. $(-31; 0)$ B. $(0; 31)$ C. $(0; -31)$ D. $(0; -15)$