

**ĐỀ THI THỬ TRỰC TUYẾN**

(Đề thi có 2 trang)

**CHƯƠNG TRÌNH L10,L11 + HỌC KỲ 1 & GIỮA KỲ 2 LỚP  
12 - NĂM HỌC 2026-2027****MÔN: VẬT LÝ - THPT***Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề**Phát hành ngày 21/07/2026*

Họ và tên: .....

Số báo danh: .....

**Mã đề: L.CG2.037****ĐÚNG/SAI**

**Câu 1.** Một bọt khí thể tích  $1,37 \text{ cm}^3$  ở đáy một hồ sâu 25 m nổi lên mặt nước; coi nhiệt độ nước không đổi, áp suất khí quyển  $10^5 \text{ Pa}$  và cứ xuống sâu 10 m thì áp suất tăng thêm  $10^5 \text{ Pa}$ . Lốp một chiếc xe được bơm tới áp suất  $2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$  lúc lốp còn nguội ở  $18^\circ\text{C}$  sau khi chạy đường dài, lốp nóng lên tới  $67^\circ\text{C}$ , thể tích lốp coi như không đổi.

- a) Quá trình bọt khí nổi lên coi là đẳng tích.
- b) Hiện tượng “thức ăn trong nồi áp suất chín nhanh hơn” được giải thích là quá trình đẳng tích: nhiệt độ tăng kéo áp suất tăng vượt sức chịu của vỏ bình.
- c) Áp suất trong lốp lúc nóng bằng  $7,44 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ .
- d) Bóng thám không nở to khi bay lên cao vì áp suất khí quyển giảm mạnh hơn mức giảm của nhiệt độ.

**Câu 2.** Một lượng khí có thể tích 35,3 lít ở điều kiện tiêu chuẩn; thể tích mol là 22,4 lít/mol và  $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ . Một bình thể tích 17 lít chứa  $43 \cdot 10^{22}$  phân tử khí.

- a) Áp suất chất khí lên thành bình sinh ra do các phân tử va chạm vào thành bình.
- b) Lượng khí ở điều kiện tiêu chuẩn ấy có 1,58 mol.
- c) So với khoảng cách giữa chúng, kích thước các phân tử khí lớn hơn nhiều.
- d) Lượng khí ấy chứa  $9,49 \cdot 10^{23}$  phân tử.

**Câu 3.** Một khối bạc khối lượng 4,9 kg đang ở đúng nhiệt độ nóng chảy  $962^\circ\text{C}$  nhiệt nóng chảy riêng của bạc là  $88 \cdot 10^3 \text{ J/kg}$ . Một khối nước đá khối lượng 4,5 kg ở  $-10^\circ\text{C}$  nhiệt dung riêng của nước đá là  $2100 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ , nhiệt nóng chảy riêng là  $340 \cdot 10^3 \text{ J/kg}$ .

- a) Nhiệt lượng làm nóng chảy được tính bằng  $Q = \lambda m$ .
- b) Nếu khối bạc nặng gấp đôi thì nhiệt lượng cần cung cấp để nó nóng chảy hoàn toàn không đổi.
- c) Nhiệt lượng làm khối nước đá nóng chảy hoàn toàn bằng 1625 kJ.
- d) Muốn làm chảy khối nước đá ở dưới không độ, phải đun nó lên  $0^\circ\text{C}$  trước rồi mới nóng chảy.

**Câu 4.** Một lượng khí ở nhiệt độ không đổi có áp suất 2,7 atm và thể tích 8 lít. Dùng một bơm tay, mỗi nhát đẩy được 0,4 lít không khí ở áp suất 1 atm vào một quả bóng thể tích 6 lít đang chứa không khí cũng ở 1 atm bơm 90 nhát, coi nhiệt độ và thể tích quả bóng không đổi.

- a) Nén một lượng khí đẳng nhiệt xuống còn nửa thể tích thì áp suất giảm một nửa.
- b) Áp suất trong quả bóng sau khi bơm bằng 7 atm.
- c) Nếu bơm quá nhanh làm khí nóng lên thì kết quả tính theo định luật Boyle không còn chính xác.
- d) Bơm gấp đôi số nhát vào quả bóng ấy thì độ tăng áp suất so với lúc đầu không đổi.

**Câu 5.** Một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện 12 A xét điểm cách dây 40 cm. Một ống dây dài 50 cm quấn 2000 vòng, mang dòng điện 1,6 A. Lấy  $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$ .

- a) Đường sức từ là những đường cong khép kín.
- b) Hai đường sức từ không bao giờ cắt nhau.
- c) Cảm ứng từ trong lòng ống dây bằng 8,04 mT.
- d) Cảm ứng từ của dòng điện thẳng dài tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách tới dây.

**Câu 6.** Một nguồn phát sóng cầu; ở khoảng cách  $r$  cường độ sóng bằng 320 đơn vị.

- a) Sóng truyền đi năng lượng mà không truyền vật chất.
- b) Biên độ tăng gấp 2 lần thì năng lượng tăng gấp 4 lần.
- c) Năng lượng sóng tỉ lệ với bình phương biên độ.
- d) Ở khoảng cách  $4r$ , cường độ bằng 80 đơn vị.

**Câu 7.** Một khung dây 50 vòng, diện tích mỗi vòng  $50 \text{ cm}^2$ , quay đều 24 vòng mỗi giây trong từ trường đều 0,2 T, trục quay vuông góc với  $\vec{B}$ .

- a) Từ thông qua khung biến thiên đều theo thời gian.
- b) Tốc độ góc của khung liên hệ với tần số theo  $\omega = 2\pi f$ .
- c) Từ thông cực đại qua khung bằng 1 mWb.
- d) Tăng tốc độ quay của khung lên gấp đôi thì từ thông cực đại qua khung tăng gấp đôi.

**Câu 8.** Một lượng khí lí tưởng ở trạng thái đầu có áp suất  $0,8 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ , thể tích 2 lít, nhiệt độ  $18^\circ \text{C}$ .

- a) Trên hệ toạ độ  $(V, T)$ , quá trình đẳng tích cho đoạn thẳng song song với trục  $T$ .
- b) Trên đường đẳng nhiệt qua trạng thái ấy, điểm có thể tích 20 lít có áp suất  $8 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ .
- c) Đun đẳng tích tới  $140^\circ \text{C}$  rồi giãn đẳng nhiệt tới 13 lít thì áp suất cuối bằng  $1,14 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ .
- d) Trên hệ toạ độ  $(p, T)$ , quá trình đẳng nhiệt cho đoạn thẳng song song với trục  $p$ .

**Câu 9.** Một khung dây phẳng diện tích  $120 \text{ cm}^2$  đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,49 T. Khung gồm 9 vòng dây; pháp tuyến của khung hợp với  $\vec{B}$  góc  $60^\circ$ .

- a) Đơn vị của từ thông là tesla.
- b) Từ thông qua cả khung bằng 26,5 mWb.
- c) Tăng số vòng dây của khung lên gấp đôi thì từ thông qua khung không đổi.
- d) Từ thông là đại lượng vectơ.

**Câu 10.** Một lượng hơi nước ở nhiệt độ  $130^\circ \text{C}$  khối lượng mol của khí là  $18 \text{ g/mol}$ , lấy  $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$  và  $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ .

- a) Động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử bằng  $8,34 \cdot 10^{-21} \text{ J}$ .
- b) Ở không độ tuyệt đối, động năng tịnh tiến trung bình của phân tử đạt cực đại.
- c) Tốc độ căn quân phương của phân tử khí bằng 431 m/s.
- d) Muốn tốc độ căn quân phương của phân tử tăng gấp đôi thì nhiệt độ tuyệt đối phải tăng gấp đôi.