

**ĐỀ THI THỬ TRỰC TUYẾN**

(Đề thi có 2 trang)

**CHƯƠNG TRÌNH L10,L11 + HỌC KỲ 1 & GIỮA KỲ 2 LỚP
12 - NĂM HỌC 2026-2027****MÔN: VẬT LÝ - THPT***Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề**Phát hành ngày 18/08/2026*

Họ và tên:

Số báo danh:

Mã đề: L.CG2.041**ĐÚNG/SAI**

Câu 1. Một bình chứa khí heli có khối lượng riêng $0,18 \text{ kg/m}^3$ khối lượng mol của khí là 4 g/mol , $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. Khí ở áp suất $1,2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

- a) Hệ số $\frac{1}{3}$ trong công thức áp suất đến từ chỗ mỗi phân tử va chạm ba lần vào thành bình.
- b) Tốc độ căn quân phương của các phân tử bằng 2000000 m/s .
- c) Giữ khối lượng riêng không đổi, tăng áp suất lên gấp bốn thì tốc độ căn quân phương tăng gấp bốn.
- d) Áp suất khí còn viết được là $\frac{2}{3} \frac{N}{V} \overline{W_d}$.

Câu 2. Vật dao động điều hoà với biên độ 15 cm , tần số góc 10 rad/s .

- a) Vật có tốc độ lớn nhất ở vị trí cân bằng.
- b) Tốc độ cực đại của vật bằng 150 m/s .
- c) Gia tốc cực đại của vật bằng 15 m/s^2 .
- d) Vectơ gia tốc luôn hướng theo chiều chuyển động của vật.

Câu 3. Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp 100 vòng, cuộn thứ cấp 1300 vòng; điện áp đặt vào cuộn sơ cấp là 220 V và dòng qua cuộn sơ cấp là $2,7 \text{ A}$.

- a) “Bếp từ” không dựa trên cảm ứng điện từ.
- b) Dòng Foucault trong lõi máy biến áp là phần có ích, cần tăng cường.
- c) Cường độ dòng qua cuộn thứ cấp bằng $35,1 \text{ A}$.
- d) Phan điện từ hãm được đoàn tàu vì dòng Foucault sinh ra lực cản chống lại chuyển động.

Câu 4. Một lượng khí lí tưởng ở trạng thái đầu có áp suất $2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, thể tích 8 lít , nhiệt độ 45°C .

- a) Trên hệ toạ độ (p, V) , đường đẳng nhiệt là một đường thẳng.
- b) Trên đường đẳng nhiệt qua trạng thái ấy, điểm có thể tích 20 lít có áp suất $5 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.
- c) Đun đẳng tích tới 181°C rồi giãn đẳng nhiệt tới 20 lít thì áp suất cuối bằng $1,14 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.
- d) Hệ số góc của đường đẳng tích trên hệ (p, T) không phụ thuộc thể tích bình.

Câu 5. Một lượng khí có thể tích $35,3 \text{ lít}$ ở điều kiện tiêu chuẩn; thể tích mol là $22,4 \text{ lít/mol}$ và $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. Một bình thể tích 17 lít chứa $24 \cdot 10^{22}$ phân tử khí.

- a) Lượng khí ở điều kiện tiêu chuẩn ấy có $1,58 \text{ mol}$.
- b) Lượng khí ấy chứa $1,58 \cdot 10^{23}$ phân tử.
- c) Khoảng cách trung bình giữa hai phân tử trong bình vào khoảng $70,83 \text{ nm}$.
- d) Chất khí dễ nén vì khoảng cách giữa các phân tử rất lớn.

Câu 6. Một lượng khí ở áp suất không đổi có thể tích 16 lít ở 50°C .

- a) Nhiệt độ tuyệt đối ban đầu của khí bằng 50 K.
- b) Đồ thị V theo T trong quá trình đẳng áp là một nhánh hypebol.
- c) Nung nóng đẳng áp cho nhiệt độ tăng thêm 127°C thì thể tích bằng 22, 3 lít.
- d) Vẽ V theo t tính bằng độ Celsius thì đường thẳng cắt trục hoành ở -273°C .

Câu 7. Trộn 8 kg nước ở 89°C với 6 kg nước ở 24°C , bỏ qua hao phí ra môi trường.

- a) Trong quá trình trộn, nhiệt truyền từ lượng nước nhiều sang lượng nước ít.
- b) Hai vật ở cùng nhiệt độ tiếp xúc nhau thì không có nhiệt truyền theo chiều nào.
- c) Nhiệt độ khi cân bằng nhiệt bằng $61,1^\circ\text{C}$.
- d) Nếu thêm tiếp 1 kg nước ở 68°C thì nhiệt độ cuối cùng bằng $60,3^\circ\text{C}$.

Câu 8. Một mẫu sắt (Fe) có khối lượng 67 g khối lượng mol của nó là 56 g/mol, lấy $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

- a) Các nguyên tử của mẫu chất chuyển động hỗn loạn không ngừng.
- b) Số mol chất trong mẫu bằng 1, 2 mol.
- c) Giữa các nguyên tử chỉ có lực hút.
- d) Trong chuyển động Brown, hạt phấn hoa chính là một phân tử.

Câu 9. Một bình kín thể tích không đổi chứa khí ở áp suất 2 atm, nhiệt độ -1°C . Vỏ bình chịu được áp suất tối đa 5, 9 atm.

- a) Trong quá trình đẳng tích, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
- b) Đun bình tới 211°C thì áp suất bằng 1, 12 atm.
- c) Nhiệt độ cao nhất bình còn chịu được bằng 802°C .
- d) Muốn áp suất khí trong bình kín tăng gấp đôi thì nhiệt độ Celsius phải tăng gấp đôi.

Câu 10. Một khối đồng khối lượng 3, 4 kg đang ở đúng nhiệt độ nóng chảy 1083°C nhiệt nóng chảy riêng của đồng là $180 \cdot 10^3 \text{ J/kg}$. Một khối nước đá khối lượng 4, 1 kg ở -31°C nhiệt dung riêng của nước đá là $2100 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$, nhiệt nóng chảy riêng là $340 \cdot 10^3 \text{ J/kg}$.

- a) Nhiệt lượng làm nóng chảy được tính bằng $Q = \lambda m \Delta t$.
- b) Nhiệt nóng chảy riêng có đơn vị J/kg.
- c) Trong suốt quá trình nóng chảy, nhiệt độ của khối chất giữ nguyên.
- d) Nhiệt lượng làm khối nước đá nóng chảy hoàn toàn bằng 1661 kJ.